

带状疱疹和欣剋疹带状疱疹 (Shingrix) 疫苗

你需要知道什么内容



→ 什么是带状疱疹？



带状疱疹是面部或身体一侧出现的水疱样疮痛性皮炎。您可能还会发烧、头痛、发冷或胃部不适。

带状疱疹的成因是什么？

带状疱疹是由与水痘相同的病毒引起的。因此，如果您小时候得过的水痘，当您年纪大了，这种病毒可能会再次激活，成为带状疱疹。

→ 是否有带状疱疹疫苗？



有的！Shingrix 是一种疫苗，可针对带状疱疹和带状疱疹部位的皮肤疼痛（称为带状疱疹后遗神经痛）提供强有力的保护。疫苗分 2 剂接种，间隔 2 - 6 个月。

谁应该接种 Shingrix？

- 50 岁及以上的成年人
- 免疫系统较弱的 19 岁及以上成年人
- ➔ 这些群体应该获得 Shingrix，即使他们：
 - 过去得过带状疱疹
 - 接种过带状疱疹疫苗（Zostavax）（用于带状疱疹）
 - 接种过水痘疫苗（用于水痘）

我在哪里可以接种 Shingrix？

请咨询您的医生或当地药剂师。



如果我接种了疫苗，我会有什么感觉？

接种疫苗后，您可能会感到：

- 接种疫苗的部位出现酸痛、发红或肿胀
- 很疲倦
- 肌肉疼痛或头痛
- 发烧或发冷
- 胃痛或恶心



我如何才能更多地了解带状疱疹？要了解更多信息，请上网查看：

www.cdc.gov/vaccines/vpd/shingles/public/shingrix/index.html