

Paxlovid:

Lo que necesita saber



→ ¿Qué es Paxlovid?

Paxlovid es un medicamento que se utiliza en el tratamiento del COVID-19 en fase inicial, lo que significa que debe tomarlo dentro de los 5 días siguientes al inicio de los síntomas para que funcione. Paxlovid está fabricado por Pfizer y debe ser recetado por un médico.

→ ¿Qué contiene Paxlovid?


Paxlovid combina 2 medicamentos:

- **Nirmatrelvir**, que impide que el virus COVID-19 se propague a otras células del organismo
- **Ritonavir**, que ayuda a que el nirmatrelvir actúe durante más tiempo al ralentizar su paso por el organismo

→ ¿Quién puede tomar Paxlovid?

Paxlovid se receta a aquellos que tienen más probabilidades de padecer COVID-19 grave, como adultos mayores de 50 años o personas con enfermedades subyacentes como cáncer, diabetes u obesidad. Hable con su médico para saber si Paxlovid es adecuado para usted. Su médico decidirá si debe tomar Paxlovid en función de:

- Sus probabilidades de enfermarse gravemente por COVID-19
- Su historia clínica, incluida cualquier enfermedad subyacente
- Otros medicamentos que toma
- Si está embarazada o en periodo de lactancia



Paxlovid y otros medicamentos

Paxlovid puede interactuar con otros medicamentos y causar problemas de salud graves. Si un médico le receta Paxlovid, asegúrese de informarle acerca de los medicamentos que está tomando.

→ ¿Cuándo debe tomarse Paxlovid?



Paxlovid debe empezar a tomarse lo antes posible al **primer signo de síntomas**, dentro de los 5 días siguientes al inicio de los síntomas.




Si le recetan Paxlovid, la dosis estándar es de 3 comprimidos, 2 veces al día, durante 5 días. Esto incluye 2 comprimidos de nirmatrelvir y 1 comprimido de ritonavir cada vez.

→ ¿Cuáles son los efectos secundarios de Paxlovid?

La mayoría de las personas que toman Paxlovid no presentan efectos secundarios graves. Los efectos secundarios más frecuentes son diarrea y sabor metálico en la boca. Otros efectos secundarios frecuentes son:

- Dolor de cabeza
- Vomitos
- Náuseas (malestar estomacal)
- Hipertensión arterial



 Paxlovid puede provocar efectos secundarios graves en personas alérgicas o con problemas hepáticos. Deje de tomar Paxlovid inmediatamente y busque ayuda médica si tiene:



Una reacción alérgica, como:

- Erupción cutánea, urticaria, ampollas o descamación de la piel
- Llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital
- Hinchazón de la boca, labios, lengua o rostro
- Problemas para tragar o respirar
- Opresión en la garganta



Problemas hepáticos, como:

- Pérdida de apetito
- Coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos
- Orina de color oscuro
- Heces de color pálido
- Picor en la piel
- Dolor en la zona del estómago

Más información:



Para obtener más información sobre Paxlovid, visite: <https://espanol.cdc.gov/respiratory-viruses/whats-new/antiviral-treatments.html>



Visite nuestro sitio web para averiguar si puede recibir la vacuna contra el COVID-19 sin costo a través del Programa "Bridge Access" de los CDC. bit.ly/3QMEI8B

Este material ha sido desarrollado por PANDEMIC (Programa para Aliviar las Disparidades Nacionales en las Inmunizaciones Étnicas y de las Minorías en la Comunidad) con el apoyo del Acuerdo de Cooperación CDC-RFA-IP21-2113-NU21IP000597: publicado en febrero de 2024. El contenido es responsabilidad de los autores y no representa la opinión oficial ni el respaldo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ni el Gobierno de EE.UU.

